

131. Nowe stanowiska żądłówek (*Hymenoptera, Aculeata*) w Tatrzańskim Parku Narodowym i otulinie

New localities of wasp species (*Hymenoptera, Aculeata*) in the Tatra National Park and its protective zone

Podane niżej żądłowki, należące do rodzin: *Chrysididae*, *Eumenidae* i *Sphecidae* są w większości rozpowszechnione w naszym kraju. Z tych gatunków, 9 jest nowych dla Tatr Polskich.

Chrysis viridula LINNAEUS, 1761 (*Chrysididae*)

– Zakopane, Koziniec, 10 VII 1993, 1 ex. Nowy dla Tatr Polskich.

Chrysis longula ABEILLE, 1879 (*Chrysididae*)

– Jurgów (szałas), 7 VII 1994, 1 ex.

Gatunek znany w Polsce z rozproszonych stanowisk. Nowy dla Tatr Polskich.

Symmorphus bifasciatus (LINNAEUS, 1761) (*Eumenidae*)

– TPN, Wąwóz Kraków 8 VII 1988, 3 exx., leg. C. WATAŁA

– TPN, Dolina Kościeliska, 6 VII 1994, 1 ex.

– Jurgów (szałas), 7 VII 1994, 5 exx.

Gatunek znany w Polsce z rozproszonych stanowisk. Nowy dla Tatr Polskich.

Symmorphus mutinensis (BALDINI, 1894) (*Eumenidae*)

– TPN, Wąwóz Kraków, 8 VIII 1988, 1 ex., leg. C. WATAŁA

– Jurgów (szałas), 13 VIII 1993, 1 ex.

– Zakopane, Antałówka, 10 VII 1993, 1 ex.

Eumenes pedunculatus (PANZER, 1799) (*Eumenidae*)

– Zakopane, Antałówka, 9 VIII 1993, 1 ex. Nowy dla Tatr Polskich.

Ancistrocerus scoticus (CURTIS, 1826) (*Eumenidae*)

– Zakopane, Antałówka, 9 VIII 1993, 1 ex.

Gatunek północno-górski.

Pemphredon lugubris (FABRICIUS, 1793) (*Sphecidae*)

– Zakopane, Antałówka, 9 VIII 1993, 1 ex. Nowy dla Tatr Polskich.

Mellinus crabroneus (THUNBERG, 1791) (*Sphecidae*)

– Jurgów (szałas), 13 VIII 1993, 1 ex. Nowy dla Tatr Polskich.

Trypoxylon figulus (LINNAEUS, 1758) (*Sphecidae*)

– TPN, Polana Stoły, 9 VIII 1993, 1 ex.

– TPN, Smreczyński Staw, 8 VIII 1993, 2 exx.

– Zakopane, Antałówka, 21 VI 1994, 1 ex.

Nysson spinosus (FORSTER, 1771) (*Sphecidae*)

- TPN, Dolina Kościeliska, 6 VII 1994, 1 ex.
- Zakopane, Antałówka, 21 VI 1994, 1 ex. Nowy dla Tatr Polskich.

Ectemnius ruficornis (ZETTERSTEDT, 1838) (*Sphecidae*)

- Zakopane, Krzeptówki, 31 VIII 1985, 1 ex., leg. C. WATAŁA
- TPN, Smreczyński Staw, 23 VII 1994, 2 exx. Nowy dla Tatr Polskich.

Crossocerus dimidiatus (FABRICIUS, 1781) (*Sphecidae*)

- Zakopane, Antałówka, 10 VII 1993, 2 exx.

Crossocerus capitosus (SHUCKARD, 1837) (*Sphecidae*)

- Zakopane, Kuźnice, 10 IX 1992, 1 ex. Nowy dla Tatr Polskich.

Crossocerus elongatulus (VAN DER LINDEN, 1829) (*Sphecidae*)

- Zakopane, Antałówka, 10 VII 1993, 1 ex.

Crossocerus leucostoma (LINNAEUS, 1758) (*Sphecidae*)

- TPN, Polana Stoły, 9 VIII 1993, 1 ex.

Gatunek znany z północnej oraz środkowej Europy, gdzie występuje głównie w górach.

JAN K. KOWALCZYK, Łódź
MACIEJ KRZĘPTOWSKI, Łódź

132. Nowe stanowisko *Colias erate* (ESPER, 1804) w Polsce (*Lepidoptera*,
Pieridae)

New record of *Colias erate* (ESPER, 1804) in Poland (*Lepidoptera*, *Pieridae*)

Na terenie Polski gatunek ten został znaleziony w Pieninach, Beskidzie Wyspowym i Bieszczadach, w roku 1990. Prowadząc badania w Beskidzie Niskim, w okolicach wsi Zyndranowa (UTM EV56), na rozległym pastwisku, złowiłem (3 IX 1994) jednego nieuszkodzonego motyla (1 ♂). Stanowisko to znajduje się niedaleko od Przełęczu Dukielskiej. Prawdopodobnie jest to droga rozprzestrzeniania się na terenie naszego kraju tego gatunku motyla. Okaz dowodowy znajduje się w kolekcji autora.

WOJCIECH KUBASIK, Poznań